


Væske i mellomøret kan føre til nedsatt hørsel og forsinket språkutvikling hos barn og behandles med innsetting av ventilasjonsrør i trommehinnen. Behandlingen kan gi rett til nødvendig helsehjelp, og utføres både offentlig og privat.



Kilde: NPR/SSB




Definisjoner

Følgende koder definerer pasientgruppen:

Prosedurekoden (NCSP) DCA20 er brukt for ISF-finansierte sykehus, takstene K02c, K02d, K02e eller K02g er brukt for avtalespesialister.

Privat behandler er private sykehus og spesialister som har avtale om behandling med den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Ventilasjonsrør i trommehinnen, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100.000 innbyggere pr. boområde, gj.snitt 2011-2013 og pr. år



Kilde: NPR/SSB



	2011	2012	2013	Gj.snitt (%)
Offentlig sykehus	5 533	5 492	4 986	5 337 (71%)
Privat behandler	1 867	1 997	2 576	2 147 (29%)
Totalt	7 400	7 489	7 562	7 484 (100%)

Inngrep pr. år og gj.snitt 2011-2013

Kommentarer

Det har i gjennomsnitt vært utført 7 500 inngrep pr. år i 2011-2013. Det var i 2013 en nedgang i denne typen inngrep ved offentlige sykehus, men økt aktivitet hos private behandlere medførte at antall inngrep er stabilt i perioden. I Oslo behandles 73 % hos private, i boområdene til Helse Stavanger og Nordlandssykehuset ingen.

Den samlede raten for inngrepet er 3 ganger så høy for bosatte i området Helse Nord-Trøndelag som for bosatte i området Bergen. Det er ingen kjent geografisk variasjon i sykkelighet, hvilket indikerer at det er en uberettiget variasjon i utførelse av denne typen inngrep.

Ventilasjonsrør i trommehinnen, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100.000 innbyggere pr. boområde, fordelt på offentlig og privat behandler, gj.snitt 2011-2013